

A lembrar:

- A Dermatite Atópica Canina é uma doença alérgica que provoca comichão;
- São necessários testes para descartar alergias alimentares ou parasitas externos, como as pulgas;
- Pode provocar queda de pelo, pele vermelha e, por vezes, otites;
- Existem várias raças predispostas a ter Dermatite Atópica Canina.

Em caso de dúvida, não hesite em contactar-nos.



Dra. Verónica Azevedo  
C.P. 4429



**URGÊNCIAS 24H**  
212 167 360

**Médico Veterinário  
Permanente**

**HOSPITAL VETERINÁRIO**

Avenida do parque da cidade, 10 A/B 2830-231  
Barreiro Quinta da lomba Santo André  
TEL +351 212 167 360 / EMAIL [hospital@vetsuldotejo.pt](mailto:hospital@vetsuldotejo.pt)

Consultas por marcação

10-21h Segunda a Sábado  
10-14h Domingos e Feriados

**VETCARE & BOUTIQUE**

Avenida dos Ferroviários, lote 103 loja  
Urbanização Vale flores 2955-409 Pinhal Novo  
TEL +351 212 362 336 / EMAIL [vetcare@vetsuldotejo.pt](mailto:vetcare@vetsuldotejo.pt)

Consultas por marcação

10-13h 15-20h Segunda a Sexta  
10-13h 14-19h Sábado e Feriados

## DERMATITE ATÓPICA CANINA



Saiba mais sobre ela.



**SUL DOTEJO**

*Cuidamos com o coração!*

## O que é a Dermatite Atópica Canina?

A dermatite atópica canina é uma doença cutânea alérgica inflamatória, que provoca comichão, com predisposição genética e aspectos clínicos característicos associados na maior parte dos casos a anticorpos específicos (IgE), mais frequentemente dirigidos contra alérgenos ambientais. Contudo, a dermatite atópica é uma doença complexa que envolve muitos factores do animal mas também factores ambientais. É clinicamente indiferenciável da alergia alimentar, diferindo apenas na origem dos alérgenos responsáveis pela sintomatologia clínica, neste caso, alérgenos alimentares. Por este motivo, o diagnóstico de uma dermatite atópica canina é **somente um diagnóstico clínico de exclusão**, sendo por este motivo essencial eliminar parasitas externos (pulgas e ácaros) e avaliar o papel dos alimentos. Os alérgenos ambientais podem ser absorvidos pela pele, por inalação e até mesmo por ingestão.



## Quais são os sinais clínicos?

Os sinais clínicos surgem no geral entre o ano de idade e os 3 anos. Podem variar na sua localização, mas há sempre a presença de prurido (=comichão). As zonas mais frequentemente afectadas são as extremidades podais, axilas, zona abdominal/inguinal, face e orelhas. O auto-traumatismo, devido à presença de comichão, pode resultar em pele inflamada (rosada/avermelhada), alopecia (=peladas), escoriações, liquenificação (pele espessada), hiperpigmentação (pele mais escura), infecções secundárias, entre outras lesões. A otite externa é um achado comum em animais alérgicos.



## Quais são os alérgenos mais comuns?

- Pólenes de plantas, árvores e gramíneas
- Ácaros do pó
- Penas e escamas
- Fungos (bolores)

## Raças com maior predisposição:

- Labrador Retriever
- Golden Retriever
- West Highland White Terrier
- Bulldog Francês e Inglês
- Bull Terrier
- Pastor Alemão
- Dálmata
- Pug
- Shar-Pei
- Boxer
- E outras



## Como se trata?

Não existe nenhum tratamento *standard*, nem nenhum tratamento absoluto para a atopia e as alergias não têm cura. Os tratamentos mais utilizados com mais frequência passam pela administração de corticosteróides, anti-histamínicos, ciclosporina A, imunoterapia, ácidos gordos essenciais e banhos frequentes. O tratamento deve ser direccionado a cada animal, segundo a avaliação do médico veterinário.