

A considerar:

- A cirurgia electiva (em oposição à cirurgia de urgência) tem menores riscos associados;
- Antes de qualquer procedimento cirúrgico, cada animal é avaliado num momento de consulta e são definidas individualmente as análises pré-anestésicas a realizar;
- As cadelas e gatas jovens, quando saudáveis, têm uma excelente recuperação pós-cirúrgica.

Em caso de dúvida, não hesite em contactar-nos.



Dra. Isabel Grou  
C.P. 4496



**URGÊNCIAS 24H**  
212 167 360

**Médico Veterinário**  
**Permanente**

**HOSPITAL VETERINÁRIO**

*Avenida do parque da cidade, 10 A/B 2830-231*

*Barreiro Quinta da lomba Santo André*

**TEL +351 212 167 360 / EMAIL [hospital@vetsuldotejo.pt](mailto:hospital@vetsuldotejo.pt)**

Consultas por marcação

10-21h Segunda a Sábado

10-14h Domingos e Feriados

**VETCARE & BOUTIQUE**

*Avenida dos Ferroviários, lote 103 loja*

*Urbanização Vale flores 2955-409 Pinhal Novo*

**TEL +351 212 362 336 / EMAIL [vetcare@vetsuldotejo.pt](mailto:vetcare@vetsuldotejo.pt)**

Consultas por marcação

10-13h 15-20h Segunda a Sexta

10-13h 14-19h Sábado e Feriados

## ESTERILIZAÇÃO DA CADELA E DA GATA



Saiba como, porquê  
e quando.




**SULDOTEJO**

*Cuidamos com o coração!*

## Como?

A esterilização de cadelas e gatas é feita, no Hospital Veterinário Sul do Tejo, através de uma cirurgia chamada ovariectomia (OVH), que consiste na remoção do útero e dos ovários.



## Porquê?

- Previne o aparecimento de tumores mamários (se efectuada antes do primeiro cio);
- Suprime o ciclo hormonal, ou seja, elimina osaios e conseqüentemente gestações indesejadas;
- Previne o aparecimento de patologias do aparelho reprodutor feminino:
  - Piómetras (infecções uterinas);
  - Tumores de ovário;
  - Tumores de útero.

## Quando?



Antes do primeiro cio, que, por norma ocorre após os 6 meses de idade na altura da primeira primavera.



Antes do primeiro cio, ou seja, por volta dos 6 meses de idade.

Em ambas as espécies, devemos evitar a altura do cio para fazer a esterilização. Existe um maior aporte sanguíneo a todos os órgãos reprodutores, fazendo com que seja mais provável a ocorrência de algum tipo de hemorragia (durante ou após a cirurgia).

## Alguns mitos e factos...

- Nenhuma fêmea (cadela ou gata) necessita ter uma ninhada para ter o seu desenvolvimento completo.
- A prevenção de tumores mamários é feita com a esterilização precoce, e não com o facto de ter uma ninhada.
- A administração de contraceptivos predispõe a ocorrência de infecções uterinas (piómetra) e tumores mamários.
- A esterilização só faz os animais engordarem se nós, enquanto donos, o permitirmos. Após a esterilização verificam-se alterações metabólicas relacionadas com o cessar das funções reprodutoras. Como tal, as necessidades energéticas (ou calóricas) modificam-se. Estas alterações devem ser reflectidas na alimentação. Na altura da esterilização, a dieta deve sofrer uma alteração gradual para dieta para gatinha ou cadela esterilizadas.

